

FLAVOMUNE®



VACUNA INACTIVADA CONTRA FLAVOBACTERIUM PSYCHROPHILUM, SUSPENSIÓN ACUOSA PARA INMERSIÓN

Código

401496

Composición

Cada 1 mL contiene:

Flavobacterium psychrophilum Cepa 1 entre $1,4 - 1,75 \times 10^9$ UFC

Flavobacterium psychrophilum Cepa 4 entre $6,0 - 7,5 \times 10^7$ UFC

Excipientes c.s.p. 1,0 mL

Inactivante: Solución de formaldehído

Especies de destino

Salmón del Atlántico (*Salmo salar*), Salmón coho (*Oncorhynchus kisutch*) y Trucha arcoiris (*Oncorhynchus mykiss*), a partir de los 4 gramos de peso.

Indicaciones

Inmunización activa, para reducir la mortalidad asociada a Flavobacteriosis producida por *Flavobacterium psychrophilum*, en Salmón del Atlántico, Salmón coho y Trucha arcoiris a partir de los 4 gramos.

Dosis, vía de administración y modo de empleo

Agitar vigorosamente los frascos antes de usar. Se debe detener el flujo de agua en el estanque y mantener con un mínimo de 8 ppm de oxígeno disuelto (DO). Preparar una dilución de 1 L de vacuna por cada 1.000 L de agua dulce del estanque. Para ello, previamente se diluye 1 L de la vacuna en 10 L de agua dulce del estanque. Luego esta solución se aplica al estanque con 990 L de agua dulce para su debida homogenización. Una vez preparada la dilución, la vacunación se debe realizar en el lapso máximo de 6 horas. Sumergir los peces durante 1 hora para que el proceso de vacunación sea óptimo. La biomasa posible de inmunizar por unidad de volumen de suspensión vaccinal es de 80 kg/L de vacuna. El protocolo de vacunación consta de 1 inmunización, a partir de los 4 gramos de peso.

Contraindicaciones

No vacunar durante el proceso de smoltificación.

No vacunar peces reproductores.

No efectuar otros tratamientos con los peces durante el proceso de vacunación.

No vacunar peces enfermos, débiles o estresados.

No vacunar peces con lesiones o infecciones cutáneas o branquiales, ni en situaciones de déficit de oxígeno o presencia de algas y/o microalgas.

No vacunar a los peces a temperaturas del agua superiores a 17°C.

No vacunar peces que hayan sido recientemente transportados desde otro lugar al sitio de vacunación, incluyendo un tiempo mínimo de 12 horas de descanso pre-vacunación.

Efectos no deseados y reacciones adversas

No se conocen efectos indeseados asociados a la aplicación de la vacuna.

Advertencias y precauciones especiales de uso

No exceder la aplicación por más de 1 hora y 15 min.

La aplicación debe hacerse a peces con ayuno previo de 24 horas.

Los peces deben nadar libremente en el estanque durante la aplicación de la vacuna, no superando una densidad de 35 kg/m³.

No realizar más de 16 inmersiones con la misma solución preparada 1:1000.

No aplicar cuando las condiciones del agua estén alteradas especialmente por presencia de materia orgánica y sedimentos que aparecen después de las lluvias.

Una vez aplicada la vacuna, no trasladar los peces al mar antes de las 600 UTA.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Período de resguardo

0 grados días.

Período de eficacia

18 meses. Una vez abierto, utilizar en su totalidad y eliminar el excedente.

Almacenamiento

Mantener refrigerado. Entre 2 y 8°C. No congelar

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl

Presentaciones

1 L

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por:

Veterquímica S.A.

USO VETERINARIO

REG. SAG N°2160-BP

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl