

OVAPRIM®

FICHA TÉCNICA



HORMONA LÍQUIDA

AGENTE OVULADOR / ESPERMIADOR

DESCRIPCIÓN:

Análogo de la hormona liberadora de gonadotropina de salmón 20 µg/mL + domperidona 10 mg/mL)

Ovaprim® es una preparación líquida de péptidos líquidos que contiene un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina de salmón (sGnRHa) y un inhibidor de neurotransmisores cerebrales (dopamina). El sGnRHa provoca la liberación de gonadotropinas almacenadas desde la glándula pituitaria. El inhibidor de dopamina (Domperidone) ayuda a eliminar otras inhibiciones de la liberación de GnRH. La liberación de gonadotropinas pituitarias almacenadas puede favorecer la desove estimulando la ovulación y la espermiación en peces sexualmente maduros.

INDICACIÓN:

Uso intraperitoneal o intramuscular como ayuda para desove en reproductores de peces.

INSTRUCCIONES DE USO:

Este producto viene en formato líquido listo para usar. Las cantidades precisas para inyecciones individuales deben extraerse directamente del frasco a una jeringa. Debido a la viscosidad del producto, se recomienda encarecidamente el uso de jeringas con puntas enroscables o agujas permanentemente unidas.

CARGA DE LA DOSIS:

Retire solo la cantidad de solución necesaria según el peso del pez. Con la aguja apuntando hacia arriba y dirigiéndola lejos de su rostro, apriete suavemente la jeringa para expulsar cualquier aire atrapado.

PROCESO DE INYECCIÓN:


Sujete firmemente al pez e introduzca la aguja en la cavidad abdominal entre la aleta pélvica y la abertura u ocasión en el músculo a cada lado de la aleta dorsal. Para la inyección intraabdominal en especies más pequeñas, puede ser útil colocar al pez sobre una superficie blanda y húmeda, como una esponja, colocarlo de lado e inyectar en la cavidad abdominal trasera para evitar contacto con órganos internos. Inyecte con cuidado. Después de la inyección, coloque suavemente al pez en un contenedor de agua limpia y aireada. El uso de una protección de aguja para limitar la penetración de la aguja en el pez puede ser útil, y también se recomienda el uso de una jeringa tuberculina o similar para una dosificación precisa en peces pequeños y para minimizar el trauma en el sitio de la inyección. No se recomienda la inyección intramuscular ya que puede provocar sangrado en el sitio de la inyección. La hinchazón, ulceración, decoloración, enrojecimiento o hipopigmentación también pueden observarse en el sitio de la inyección.

DOSIFICACIÓN:

Una dosis general es de **0.5 ml por kilogramo de peso corporal**. La dosis puede variar entre las especies de peces y el estado fisiológico de los animales.

Para la mayoría de las especies, se requiere solo una dosis, pero el tratamiento con una dosis única sólo es efectivo en peces que se encuentran dentro o cerca de su temporada natural de desove. Para otras especies, puede ser necesario realizar una dosis dividida. Para la dosificación escalonada, se debe inyectar una dosis de carga del 10% de la dosis total, seguida por inyección del 90% restante de la dosis total al menos 6 horas después. En especies de agua templada, la ovulación puede ocurrir en tan solo 4 horas tras el tratamiento.

PRESENTACIÓN



Fabricado por

NSHF®
宁波第二激素厂

Ningbo Second Hormone Factory

¡Contactanos!

(51) 967 401 671

(51) 921 573 297

ventas@acuivetsac.com

www.acuivetsac.com

Síguenos:

