

YENI - VAC®



VACUNA INACTIVADA CONTRA LA ENFERMEDAD DE LA BOCA ROJA, SUSPENSIÓN PARA INMERSIÓN

Código

400827

Composición

Cada 1 mL contiene:

Yersinia ruckeri Biotipo I, Serotipo 1, Cepa VQ-Yr-

001 $1 \times 10^9 - 3 \times 10^9$ UFC

Yersinia ruckeri Biotipo II, Serotipo 1, Cepa VQ-Yr-003 $3 \times 10^9 - 5 \times 10^9$ UFC

Excipientes c.s.p. 1,0 mL

Especie de destino

Salmón del Atlántico (*Salmo salar*).

Indicaciones

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad Entrérica de la Boca Roja producida por *Yersinia ruckeri*.

Dosis, vía de administración y modo de empleo

Dosis:

La biomasa posible de inmunizar por unidad de volumen de suspensión vaccinal es de 100 kg/L de vacuna.

Sumergir los peces durante 30 segundos para que el proceso de vacunación sea óptimo.

Edad o peso, frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

El protocolo de vacunación consta de 1 inmunización, a partir de los 4 gramos de peso.

Vía de administración:

Inmersión.

Modo de empleo:

Agitar vigorosamente antes de usar.

Se debe detener el flujo de agua en el estanque y mantener con un mínimo de 8 ppm de oxígeno disuelto (DO).

Preparar una dilución de la vacuna 1:10, agregando 1 litro de vacuna más 9 litros de agua dulce. Una vez preparada la dilución, la vacunación debe realizarse en un lapso máximo de 2 horas.

Contraindicaciones

No vacunar durante el proceso de smoltificación. No vacunar peces reproductores. No efectuar otros tratamientos con los peces durante el proceso de vacunación.

No vacunar peces enfermos, débiles o estresados. No vacunar peces con lesiones o infecciones cutáneas o branquiales, ni en situaciones de déficit de oxígeno o presencia de algas y/o microalgas. No vacunar peces que hayan sido recientemente transportados desde otro lugar al sitio de vacunación, incluyendo un tiempo mínimo de 12 horas de descanso pre-vacunación.

Efectos adversos o reacciones adversas

No se conocen efectos indeseados asociados a la aplicación de la vacuna.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Una vez aplicada la vacuna, no trasladar los peces al mar antes de las 450 UTA.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

La aplicación debe hacerse a peces con ayuno previo de 24 horas.

Los peces deben nadar libremente en el estanque durante la aplicación de la vacuna, no superando una densidad de 35 kg/m³.

No realizar más de 20 inmersiones con la misma solución preparada 1:10.

No aplicar cuando las condiciones del agua estén alteradas especialmente por presencia de materia orgánica y sedimentos que aparecen después de las lluvias.

Período de resguardo

0 grados días.

Período de eficacia

18 meses.

Almacenamiento

Mantener refrigerado. Entre 2 y 8°C. No congelar

Presentaciones

1 L

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por

Veterquímica S.A.

Razón del cambio

Renovación del producto y actualización de formato (25.06.2020)

USO VETERINARIO
REG. PROV. SAG N°1791-B

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl